

Estação do Norte Transmontano

Circular nº: 2/2019

Chaves, 20 Fevereiro de 2019

VINHA

Combate às infestantes

A forte concorrência que as infestantes mantêm com a videira, relativamente a água, nutrientes e luz, provoca efeitos prejudiciais na cultura, que é necessário minimizar ou eliminar.

A escolha da técnica a utilizar deve ser sempre feita tendo em consideração factores como a estrutura e disponibilidade de água no solo, declive do terreno possibilitando ou não a mobilização mecânica do solo, entre outros.

Sempre que tenha necessidade de recorrer à monda química, deverá ter especial atenção à escolha do herbicida a utilizar, considerando a idade da vinha, natureza do solo, quais as infestantes e a época de tratamento.

Sempre que possível, reduza a sua aplicação, ou pelo menos limite a sua utilização à zona da linha das videiras, dando preferência a herbicidas menos tóxicos, quer para o homem quer para o ambiente.

Principais regras a respeitar;

- Antes de utilizar o herbicida leia atentamente o rótulo da embalagem e tenha particular atenção às nele descritas.
- Não aplique o herbicida em dias de vento.
- Utilizar pulverizadores com bicos apropriados.
- Nunca utilize atomizadores.
- A aplicação deve ser dirigida ao solo sem atingir as videiras.
- Respeitar as doses e condições de aplicação descritas no rótulo da embalagem.

* Enviamos junto a lista dos herbicidas homologados para a vinha.

O responsável pela Estação de Avisos



Luís Sá
Técnico superior

HERBICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATER AS INFESTANTES DA VINHA				
SUBSTANCIA ACTIVA	PRODUTO COMERCIAL (formulação)	MODO ACÇÃO	I. S.	IDADE DA VINHA
		a)	b)	c)
HERBICIDAS PARA APLICAÇÃO À PARTE AÉREA DAS INFESTANTES				
ácido nonanoico/pelargónico	BELOUKHA (SL)	C	-	1º ano
ciclodime	FOCUS ULTRA (EC)	S	28	1º ano
diquato	REGLONE (SL); DESSICASH 200 SL (SL); DIQUATO SAPEC (SL); FANDANGO (SL); DIQUE (SL); DIQUOSTAR (SL); REQUAT (SL); SEQUASH (SL)	C	-	1º ano
fluzifope-p-butilo	FUSILADE MAX (EC)	S	7	1º ano
glifosato (sal de isopropilamónio)	ASTEROIDE (SL), BUGGY NEO (SL), CATAMARAN (SL), CLINIC DIRECT 360 (SL), CLINIC UP(SL), ENVISION 45 (SL), GLYFOFLASH XL (SL), GLYPHOGAN (SL), HELOSATE PLUS (SL), MARQUI (SL), MONTANA SAPEC (SL), MONTANA SUPRA 450 SL, NUFOSATE PRO (SL), PITON FORTE (SL), PITON VERDE (SL), PREMIER 45 ENVISION (SL), RONAGRO (SL), ROUDUP ULTRA MAX (SL), RUMBO EXTRA (SL), SATÉLITE (SL), SERENO (SL), TOUCHDOWN PREMIUM (SL)	S	28	3º ano
glufosinato de amónio	BASTA S (SL), TROLEY, GLUFOSTAR	C	14	1º ano
propaquizafope	AGIL (EC), ZETROLA	S	28	1º ano
quizalofope-p-etilo	TARGA GOLD (EC)	S	28	1º ano
HERBICIDAS DE APLICAÇÃO AO SOLO				
diflufenicão	BATUTA (SC); ZENITE (SC)	R	-	4º ano
isoxabena	CENT-7 (SC); FLEXIDOR (SC)	R	-	1º ano
oxifluorfena	GALIGAN 240 EC (EC), DAKAR (EC), FUEGO (EC)	C	-	3º ano
pendimetalina	STOMP AQUA (CS), SHARPEN 33% EC (EC), INCA (CS), MOST MICRO (CS), ACTIVUS SC (SC), ACTIVUS (EC), PENDINOVA (EC), STARLINA (EC), STARPENDI (EC)	R - C	-	1º ano
penoxsulame	VIPER (OD)	R	-	4º ano
HERBICIDAS MISTOS				
diflufenicão+glifosato	ZARPA (SC), ALIADO (SC), FUJI (SC), SIROCO (SC)	S - R	-	4º ano
diflufenicão+metribuzina	TAVAS (SC)	S - R - C	-	4º ano
flazassulfurão	KATANA 25% WG (WG), CHIKARA (WG), ZAGALA (WG), ORFEU (WG), MINSK (WG), HERBOR OLIVIT (WG)	S - R	-	3º ano
flazassulfurão+glifosato	CHICARA DUO (WG)	S - R	-	3º ano
glifosato (sal de isopropilamónio) + oxifluorfena	LASER PLUS (SC), GLITZ SUPER (SC), KUMASI (SC)	S - C	-	3º ano
propizamida	KERB FLO (SC)	S - R	180	1º ano

a) - (formulação):-	b) - Modo de acção	c) - I. S. - Intervalo de segurança
AL - líquido	R - residual	- Período de tempo mínimo que deve decorrer entre a aplicação do produto e a colheita.
EC - concentrado para emulsão	S - sistémico	
FG - grânulos finos	C - contacto	
SC - suspensão concentrada		
SG - grânulos solúveis em água		
SL - solução concentrada		
WG - grânulos dispersíveis		
WP - pó molhável		
OD - dispersão em óleo		

ANTES DA APLICAÇÃO DO PRODUTO FITOFARMACEUTICO, LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO

Fonte:- DGAV-2019